

La velocidad de descomposición de los materiales orgánicos colocados sobre los caminos está muy relacionada con la humedad que reciben; si se riegan los bancales a mano o por goteo, los caminos no reciben agua; si se riegan por aspersión, si la reciben.

Como se indicó anteriormente, con el trasplante triangular se cubre rápidamente la cama de hojas, impidiendo que entre el sol; de esta forma, se impide el desarrollo de malezas y, por lo tanto, el trabajo de deshierbe será menor.

Temperatura de Cultivos

Temporada del cultivo	Rango de Temperatura	Rango óptimo de temperatura	Planta
Cultivo de Temporada Fría	7 - 30 ° C	13 - 24 ° C	Achicoria Ajo Cebolla Cebollino Chalote Puerro Salsifis Espárrago
	4.5 - 24 ° C	15.5 - 18 ° C	Acedera Acelga Remolacha Brócoli Col Repollito de Bruselas Colinabo Colirrábano Berza Chirivía Espinaca Nabo Rábano Rábano picante Repollo
	7 - 24° C	15.5 - 18 ° C	Achicoria Alcaucil Apio Apionabo Coliflor Col china Arveja Escarola Hinojo Lechuga Mostaza Papa Perejil Zanahoria
Cultivos de Temporada Templada	10 - 26.5° C	15.5 - 21 ° C	Poroto
	10 - 35 ° C	15.5 - 24 ° C	Maíz
	10 - 32° C	15.5 - 24 ° C	Zapallito de tronco Zapallo
Cultivo de Temporada Cálida	15.5 - 32° C	15.5 - 24 ° C	Melón Pepino
	18 - 26.5° C	17 - 24 ° C	Tomate Morrón
	18 - 35° C	21 30 ° C	Berenjena Batata Pimiento Sandía

Tomado del libro *Cultivo Biointensivo de los Alimentos*, de John Jeavons, pág. 71. *Ecology Action*, 5798 Ridgewood Road, Willits, CA 95490, USA, tomado de James Edward Knott "Handbook for Vegetable Growers", John Wiley and Sons. Inc. Nueva York, págs. 6 y 7.